

AVISOS AGRÍCOLAS

ESTAÇÃO DE AVISOS DO DÃO

MACIEIRA

PEDRADO

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera prevê a continuação de tempo instável e, por este motivo, continue a manter o seu pomar protegido. A precipitação ocorrida provocou a lavagem do produto aplicado. Tenha em consideração que os produtos com ação de contacto são lavados quando ocorre uma quantidade de precipitação superior a 20 a 25 l/m². Mantenha a vigilância e adote a estratégia de proteção que melhor se aplica no seu pomar, privilegiando a alternância de substâncias ativas de forma a evitar fenómenos de resistência.

BICHADO-DA-FRUTA

O voo da praga encontra-se a níveis reduzidos, não sendo as atuais condições meteorológicas as mais favoráveis ao seu desenvolvimento. Contudo, recomendamos a monitorização da praga no seu pomar, em particular se adaptou a estratégia larvicida, observando 20 frutos em 50 árvores. O tratamento apenas se justifica se observados 5 a 10 frutos perfurados.

PIOLHOS VERDE E CINZENTO

O tempo ameno e as condições de humidade estão a favorecer novos crescimentos muito atrativos para as colónias de piolhos verde e cinzento. Avalie a presença destas pragas no seu pomar, observando 100 rebentos ao acaso. A intervenção fitossanitária é economicamente viável apenas se observar 2 a 5 de ramos infestados de piolho cinzento e/ou 10 a 15 de piolho verde.

VINHA

MÍLDIO

Encontramo-nos numa fase de grande pressão da doença, prevendo-se novo período de infeção na próxima semana. Continue a manter a sua vinha protegida, renovando o tratamento, assim que terminar a persistência de ação do anterior. Dê preferência a produtos de ação sistémica.

OÍDIO

Continue a manter a vinha protegida, pois esta encontra-se numa fase de grande sensibilidade à doença.

PODRIDÃO CINZENTA

Nas parcelas ou castas onde é habitual a ocorrência de focos desta doença, aconselha-se a realização de tratamento preventivo.

PODRIDÃO NEGRA

Mantemos a recomendação da Circular anterior, uma vez que nos encontramos, desde a formação dos bagos até ao pintor, numa fase de grande suscetibilidade da cultura à doença.

Nota: As operações culturais efetuadas durante o ciclo vegetativo são técnicas benéficas quando executadas com oportunidade. Nesta altura, é essencial proceder à orientação da vegetação para garantir a eficácia dos tratamentos fitossanitários dirigidos aos cachos e facilitar a passagem de pessoas e máquinas.

Queda de Granizo

As condições meteorológicas atuais são favoráveis à ocorrência de trovoadas. Para minimizar os estragos causados nas culturas pela eventual queda de granizo deve, logo após a sua queda, aplicar um adubo foliar rico em cálcio.

A Equipa Técnica da EADão