

CULTURA DA Videira – 2024

Produtos homologados para o combate à Escoriose (*Phomopsis* spp.)

A consulta destes quadros não dispensa a leitura atenta do rótulo do respetivo produto fitofarmacêutico

É NECESSÁRIO VERIFICAR SE A FINALIDADE PRETENDIDA (cultura e inimigo/efeito a atingir) CONSTA NO RÓTULO

Substância ativa	Modo de ação	MPB	IS (dias)	Observações
azoxistrobina	Preventivo	Não	21	Efetuar o 1º tratamento entre o gomo de algodão e a ponta verde e o 2º entre a saída das folhas e as 3 folhas livres da videira.
enxofre	Preventivo	Sim	-	Realizar o 1º tratamento quando os gomos apresentem a ponta verde e os mais adiantados tenham 1 a 2 cm de comprimento. Realizar o 2º tratamento quando os rebentos tenham um comprimento que não ultrapasse os 5 cm.
folpete	Preventivo	Não	28	-
folpete + azoxistrobina	Preventivo	Não	28	Realizar os tratamentos de acordo com os Serviços Nacional de Avisos Agrícolas, na falta destes, efetuar os tratamentos com Quadris MAX ao aparecimento dos primeiros sintomas das doenças. Efetuar o 1º tratamento entre o gomo de algodão e a ponta verde e o 2º entre a saída das folhas e as 3 folhas livres.
fosetil (na forma de sal de alumínio) + folpete	Preventivo	Não	-	Realizar uma única aplicação quando os gomos apresentem a ponta verde (BBCH 07) tendo os mais adiantados 1-2 cm de comprimento e em condições favoráveis ao desenvolvimento da doença.
fosfonatos de potássio + ditianão	Preventivo/ Sistémico	Não	42	-
metirame	Preventivo	Não	28	Realizar o primeiro tratamento ao gomo de algodão-ponta verde (rebentos até 1 a 2 cm de comprimento); o segundo tratamento à saída das folhas-folhas livres (rebentos até 5 cm de comprimento).
piraclostrobina + metirame	Preventivo	Não	56	-