

Substância ativa	Nome Comercial	Observações	IS
azoxistrobina	QUADRI	Efectuar o 1º tratamento entre o gomo de algodão e a ponta verde e o 2º entre a saída das folhas e as 3 folhas livres da videira. Para evitar o desenvolvimento de resistências realizar no máximo 3 tratamentos por ano e no conjunto das doenças, com este produto ou outro com o mesmo modo de ação (Qol).	21
azoxistrobina + folpete	QUADRI MAX, TAGUS F, TRUNFO F	Realizar os tratamentos de acordo com os Serviços Nacional de Avisos Agrícolas, na falta destes, efetuar os tratamentos com Quadri MAX ao aparecimento dos primeiros sintomas das doenças. Efectuar o 1º tratamento entre o gomo de algodão e a ponta verde e o 2º entre a saída das folhas e as 3 folhas livres. Para evitar o desenvolvimento de resistências realizar no máximo 3 tratamentos por campanha, no conjunto das doenças, com este produto ou com outros fungicidas com o mesmo modo de ação (Qol).	
cobre (sob a forma de óxido cuproso) + óleos parafínicos	RED FOX	Desde a fase de gomo de algodão até à ponta verde (BBCH05) ou após o surgimento das primeiras folhas até as folhas totalmente desenvolvidas (BBCH 11-13). Aplicar no máximo 4 Kg de cobre/ha/ano no mesmo solo agrícola.	
ditianão + fosfonatos de potássio	ENVITA	Realizar os tratamentos de acordo com as indicações do Serviço Nacional de Avisos Agrícolas. Na sua falta efetuar um tratamento entre o gomo de algodão e as 3 folhas livres. Em vinhas fortemente atacadas efetuar dois tratamentos: o primeiro entre o gomo de algodão e a ponta verde das folhas e o segundo entre a saída das folhas e as 3 folhas livres. Realizar no máximo 4 aplicações por campanha e no conjunto das doenças.	42
enxofre	VÁRIOS	1º tratamento quando os gomos apresentem a ponta verde e os mais adiantados tenham 1-2 cm. 2º tratamento quando os rebentos não ultrapassem os 5 cm. O uso do produto na concentração mais elevada pode, eventualmente, dar origem à ocorrência de fitotoxicidade	
folpete	SOLOFOL, FOLLOW 80 WG, Fol-HiTec, FLEXI 80 WG, FOLLET 80 WG	Efectuar o 1º tratamento no BBCH 07 e o 2º tratamento no BBCH 12-13 (2-3 folhas separadas).	28
folpete + fosetil (na forma de sal de alumínio)	RHODAX FLASH	Realizar uma única aplicação quando os gomos apresentem a ponta verde (BBCH 07) tendo os mais adiantados 1-2 cm de comprimento e em condições favoráveis ao desenvolvimento da doença.	- /
fosetil (na forma de sal de alumínio) + mancozebe	MAESTRO M WG ADVANCE, ZETYL MZ WG, ALFIL DUPLO WG	Realizar o primeiro tratamento quando os gomos apresentam a ponta verde e os mais adiantados têm 1-2 cm de comprimento. O segundo tratamento deve ser realizado às 3 a 4 folhas abertas ou quando os rebentos tenham comprimento que não ultrapasse 5 cm. Em vinhas menos atacadas poderá realizar apenas um tratamento às 3 a 4 folhas abertas. Para evitar o desenvolvimento de resistências, no conjunto das doenças, não aplicar este produto, mais de 3 vezes por campanha.	28
mancozebe	VÁRIOS	O primeiro tratamento quando os gomos apresentam a ponta verde até 1-2 cm de comprimento e o segundo tratamento entre a saída das folhas e as três folhas expandidas. Realizar no máximo 4 tratamentos, no conjunto das doenças e por época cultural, com este ou outro produto do grupo dos ditiocarbamatos.	28
metirame	POLYRAM DF	Realizar o primeiro tratamento ao gomo de algodão-ponta verde (rebentos até 1 a 2 cm de comprimento); o segundo tratamento entre saída das folhas e folhas livres (rebentos até 5 cm de comprimento) (BBCH 05-19). Não realizar mais de três tratamentos, por cultura e por campanha com POLYRAM DF ou com outro fungicida pertencente ao grupo dos ditiocarbamatos (mancozebe, propinebe, tirame, zirame).	28
metirame + piraclostrobina	CABRIO TOP	Em condições de chuva, favoráveis à dispersão da doença, o período de proteção está compreendido entre os estados fenológicos ponta verde e três folhas livres (BBCH 04-12). Efetuar um tratamento entre o gomo de algodão e as três folhas livres. Em vinhas fortemente atacadas efetuar dois tratamentos: o primeiro entre o gomo de algodão e a ponta verde das folhas e o segundo entre a saída das folhas e as três folhas livres. Para evitar o desenvolvimento de resistências, não aplicar este produto ou qualquer outro que contenha Qol mais de 3 tratamentos por ano, no conjunto das doenças visadas (míldio, escoriose, black rot e oídio). Não efetuar mais de 2 aplicações consecutivas com este produto. O tratamento seguinte deve ser realizado com um fungicida dotado de um modo de ação bioquímico diferente podendo posteriormente recorrer-se a um 3º tratamento com este produto.	56