

AVISOS AGRÍCOLAS

ESTAÇÃO DE AVISOS DO DÃO

MACIEIRA - Pedrado

O IPMA prevê novo período de chuvas a partir do próximo fim de semana, que coincidem com o aparecimento de novas manchas de pedrado. Mantenha o seu pomar protegido para esta doença, renovando o tratamento antes das chuvas.

MACIEIRA - Piolho cinzento e Piolho verde

Se não efetuou tratamento contra estas pragas deve efetuar a observação de 100 rebentos ao acaso e se contabilizar 2 a 5 rebentos infestados com Piolho cinzento e/ou 10 a 15 rebentos com Piolho verde, deve realizar de imediato o tratamento.

Consulte a lista de produtos homologados para afídeos que acompanhou a circular anterior.

MACIEIRA - Bichado-da-fruta

Caso não tenha efetuado tratamento contra o bichado com um produto ovicida e tenha optado pela estratégia ovicidarvada ou larvicida, deve nesta altura efetuar o tratamento.

MACIEIRA – Cochonilha de S. José

Nalguns Postos de Observação Biológica, já foi atingido o somatório de temperaturas para a eclosão das ninfas de Cochonilha de São José. Se no ano anterior detetou a presença desta praga no seu pomar, aconselhamos tratamento apenas nas árvores infestadas, uma vez que a incidência desta praga é localizada não se justificando, na maioria dos casos, um tratamento generalizado a todo o pomar.

NOTA: Opte por substâncias ativas homologadas que combatam simultaneamente as várias pragas.

BATATA – Míldio da batateira

Atendo aos fortes ataques desta doença nos batatais da região e atendendo às previsões do IPMA, deve continuar a manter a cultura protegida para o Míldio da batateira.

A equipa técnica da EADão

VINHA - Míldio

A vinha encontra-se no estado de botões florais separados, apresentando forte crescimento. O período de precipitação irá encontrar a vinha desprotegida relativamente ao último tratamento recomendado para míldio. Deve renovar o tratamento para míldio, atendendo à fase de forte crescimento da vinha, deve tratar com um produto de ação sistémica. Este tratamento deve ser efetuado antes das chuvas previstas. Consulte a lista de produtos homologados para míldio que acompanhou a circular nº 6.

VINHA – Oídio.

Continue a manter a vinha protegida para oídio.

VINHA – Podridão negra (“black rot”)

Começaram a aparecer esta semana manchas de podridão negra resultantes de infeções em meados de abril. Se tiver observado este problema na sua vinha, na escolha do fungicida para míldio ou oídio, opte por um produto que tenha também ação sobre podridão negra. Consulte a lista para podridão negra que acompanhou a circular nº 7.

CASTANHEIRO-Vespa das Galhas do Castanheiro

O ataque do inseto *Dryocosmus kuriphilus*, vulgarmente conhecido por Vespa das Galhas do Castanheiro, manifesta-se pela presença, na altura da rebentação, de galhas nos gomos e folhas. A luta biológica é a forma mais eficaz de controlar esta praga e a ajuda de todos os produtores é imprescindível para o seu sucesso. Já foram efetuadas na região várias largadas, participadas na sua maioria pelos municípios, do inseto auxiliar o parasitoide *Torimus sinensis*. De modo a contribuir para que este inseto se estabeleça e auxilie no controlo da Vespa das Galhas do Castanheiro, é importante que não mobilize o solo até junho e partir desta altura controle as infestantes, preferencialmente, através de cortes. Não faça tratamentos com inseticidas pois para além de prejudicar as populações do inseto auxiliar, são ineficazes e não se encontram homologados.